



Gebruikershandleiding Verstrekkingen FarmaSys 6

Auteur: SmartMed

Datum: februari 2024

Versie: 1.5

© Copyright SmartMed B.V. 2022. Adres: Sparrenheuvel 36C, 3708 JE Zeist, Nederland.

Dit document is eigendom van SmartMed en de informatie erin is vertrouwelijk. Dit document mag noch in zijn geheel, noch in delen worden gereproduceerd, aan derden ter beschikking gesteld of voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor het is verstrekt, zonder schriftelijke toestemming vooraf van SmartMed.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Medicatieproces MP9	4
2	Inloggen en startscherm	5
2.1	Menuscherm	6
3	Receptverwerking	7
3.1	Controleren	8
4	Patiëntoverzicht en verstrekkingen	9
4.1	Verstrekkingsverzoek toevoegen	10
4.2	Medicatieverstrekkingen wijzigen	16
4.2.1	Preferentie	18
4.2.2	Wijzigen distributielijijn	19
4.2.3	Voorraad	24
4.2.4	Geen (lokale) voorraad	24
4.2.5	Verstrekkingshistorie	25
4.2.6	Herhaalmedicatie	26
4.2.7	Herhaling toevoegen	27
4.2.8	Waarneemmedicatie invoeren	30
4.2.9	Geen artikel gevonden	30
4.3	Medicatieverstrekking annuleren of stoppen	33
4.3.1	Medicatieverstrekking stoppen	34
4.3.2	Medicatieafpraak verwijderen	35
4.4	Medicatiebewaking en controles	36
4.4.1	Controles	37
4.4.2	Verstrekkingsverzoek controle	40
4.4.3	Leveringscontrole	41
4.4.4	Zelf controle-check toevoegen	42
4.4.5	Filter bewakingssignalen en controles	44
4.5	Picken	45
4.5.1	Nalevering/ bestellen	47
4.5.2	Batch/ charge	48

4.5.3	Onjuist artikel	48
4.5.4	Substitueren artikel	49
4.5.5	Opslaglocatie	50
4.5.6	Etiketten	50
4.5.7	Slotje	51
4.5.8	Picken vanuit patiëntendossier	52
4.6	Uitleveren	53
4.7	Nazending.....	54
4.8	Wacht op apotheker.....	56
5	Balie	58
6	“eindcontroles”	59
6.1	Wacht op apotheker.....	59
6.2	Controleren	60
6.3	Wacht op assistent	61
7	PHM (Herhaalmodule).....	62
7.1	PHM op “verstrekkingen”	64
8	Papieren receptverwerking	65
9	Overige functionaliteiten.....	66
9.1	Patiënt Memo.....	66
9.2	Printen toedieningsplan	68
9.3	Printen AMO.....	70
9.4	Printen bezorgetiket.....	72
9.5	Printen extra (recept)etiket.....	73
9.6	Bezorgen.....	74
9.7	Servicepunt.....	75
9.8	Medicijnkluis/ locker	76
9.9	IMM	77

1 Inleiding

Deze gebruikershandleiding 'Receptverwerking' is bedoeld voor de receptverwerking (o.a. het aanschrijven en medicatiebewaking) in de apotheek. Bij de receptverwerking wordt onderscheid gemaakt tussen recepten die digitaal door de voorschrijver worden aangeleverd of middels een papieren recept dat door de patiënt aan de balie in de apotheek wordt aangeboden.

De gebruiker dient kennis te hebben van de algemene navigatie binnen SmartMed. Zie hiervoor de "*Gebruikershandleiding SmartMed Algemene Navigatie F6*" en van de "*Gebruikershandleiding Patiënt beheer Farmasys 6*".

SmartMed wil het de gebruiker zo makkelijk mogelijk maken. In deze gebruikershandleiding worden vanaf het startscherm alle mogelijkheden bij de receptverwerking doorlopen. Waar mogelijk worden deze stappen ook met een voorbeeld toegelicht.


1.1 Medicatieproces MP9

FarmaSys 6 is ontwikkeld op basis van medicatieproces (MP) versie 9, ook bekend als MP9. MP9 maakt betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens mogelijk. Er is een scheiding aangebracht tussen therapeutische en logistieke gegevens. Dit heeft als voordeel dat in het medicatieoverzicht duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen wat de arts heeft voorgeschreven, gewijzigd of gestopt, wat de apotheek op basis daarvan heeft geleverd en wat de patiënt daadwerkelijk gebruikt. FarmaSys 6 maakt gebruik van de bouwstenen in deze medicatieprocesstandaard, maar kan pas volledig overgaan op MP9 zodra andere softwareleveranciers ook gebruik maken van MP9. Voor meer informatie, raadpleeg de website: <https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/medicatieproces/>

In deze handleiding wordt de werkwijze van MP9 in FarmaSys6 verder toegelicht (zie 0). In FarmaSys 6 wordt de medicatie in twee kolommen weergegeven, waarbij onderscheid wordt gemaakt in het verstrekingsverzoek (medicatie afkomstig van de voorschrijver) en het verstrekingsvoorstel (de door SmartMed voorgestelde artikelen voor verstrekking op basis van o.a. de preferentie en ingestelde distributielijnen van de apotheek).

2 Inloggen en startscherm


Start FarmaSys 6 en log in met uw e-mailadres en wachtwoord (Figuur 1).



Figuur 1 Inlogscherma FarmaSys 6

Zie voor meer informatie de ["Gebruikershandleiding SmartMed Algemene Navigatie F6"](#).

Na het inloggen bij FarmaSys 6 (F6) komt de gebruiker direct in onderstaand Startscherm F6 (Figuur 2).



Figuur 2 Startscherm F6

2.1 Menuscherf

Links bovenin staat het menu . Voor uitgebreide uitleg over het menu zie ["Gebruikershandleiding SmartMed Algemene Navigatie F6"](#).

Na klikken op het menu  komt onderstaand scherm tevoorschijn (Figuur 3). Hierbij kan worden genavigeerd in het menuscherf.



Figuur 3 Menuscherf F6

In de volgende hoofdstukken worden de functionaliteiten van het kopje 'Patiënten/Verstrekingen' (in het rode kader) beschreven.

3 Verstrekkingen

Recepten die digitaal worden doorgestuurd van de voorschrijver naar de apotheek, worden weergegeven in bij "Verstrekkingen", ook wel de 'buffer' genoemd. Onderstaand (Figuur 4) is een voorbeeld werklijst "Verstrekkingen" weergegeven.

VERSTREKKINGEN					
Zoeken op achternaam of geboortedatum (ddmmjjjj)			Filter		VERVERS
✓ GOEDKEUREN DOOR APOTHEKER 1 ✓ DUBBELE CONTROLE 2 ^ CONTROLLEREN 10					
	Distributiemethode Lokaal		Leverlijn Balie	① 	Geleverd op
	Distributiemethode Lokaal		Leverlijn Balie	①	Geleverd op
	Distributiemethode 2x CF / 1x Lokaal		Leverlijn 3x Balie	①	Geleverd op
	Distributiemethode 4x Lokaal / 1x CF		Leverlijn 3x Balie / 2x Bezorgen	①	Geleverd op
	Distributiemethode 1x Lokaal / 1x CF		Leverlijn 2x Balie	①	Geleverd op
	Distributiemethode Lokaal		Leverlijn Robowall		Geleverd op
	Distributiemethode -		Leverlijn -	①	Geleverd op
	Distributiemethode -		Leverlijn -	①	Geleverd op

Figuur 4 "verstrekkingen"


Deze werklijst is onderverdeeld in;

- Goedkeuren door apotheker
- Dubbele controle
- Controleren

Deze onderdelen worden onderstaand verder toegelicht.


3.1 Controleren

Recepten die door de voorschrijver digitaal worden doorgestuurd aan de apotheek, worden automatisch in de werklĳst onder het kopje 'Controleren' weergegeven (Figuur 5).



Figuur 5 "verstrekkingen" - controleren

- De betreffende recepten kunnen worden verwerkt door op de betreffende regel te klikken. Het patiëntoverzicht van de betreffende patiënt wordt vervolgens weergegeven, waar het verstrekingsverzoek kan worden gecontroleerd **hoofdstuk 3.1 Controleren**.
- Eventueel kan een specifieke client in deze werklĳst worden gezocht op achternaam of geboortedatum (ddmmjjjj).
- Achter de patiënt zijn eventuele symbolen aangegeven, zie onderstaande symbolen
- De (patiënten)lijst kan eventueel worden gefilterd op de bovenbeschreven symbolen (**Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**).




Figuur 6 Symbolen

4 Patiëntoverzicht en verstrekkingen

Onderstaand is het patiëntoverzicht (Figuur 7) weergegeven, welke is verdeeld in 3 vakken (zie rode kaders met nummers 1 t/m 3);

- aan de linkerzijde (rode kader, nummer 1): worden de belangrijkste patiëntgegevens weergegeven,
- in het midden (rode kader, nummer 2): worden de verstrekkingen weergegeven. De medicatie weergegeven in de linker blauwe kolom is afkomstig van de voorschrijver en wordt ook wel het **verstrekkingverzoek** genoemd. De medicatie weergegeven in de rechter witte kolom, is het door SmartMed voorgestelde artikel voor verstrekking, ook wel het **verstrekkingvoorstel** genoemd. Dit wordt automatisch gedaan op basis van o.a. de preferentie en ingestelde distributielijnen van de apotheek.
- aan de rechterzijde (rode kader nummer 3): worden de bewakingssignalen en controles weergegeven (zie onderstaande toelichting **(AANVULLEN??)**)




The screenshot displays the SmartMed interface for patient J Bos. It is divided into three main sections:

- Section 1 (Left):** Patient information including name, date of birth (28-09-2022), weight (75 kg), height (175 cm), and contact details.
- Section 2 (Center):** Medication dispensing overview. It lists medications like AERBUS TABLET FILMONHULD 5MG and XARELTO TABLET FILMONHULD 15MG, showing the prescriber's request and the pharmacy's proposal.
- Section 3 (Right):** Monitoring and controls. It includes sections for 'CONTROLES' (checks) and 'LEVERINGSCONTROLES' (delivery controls), with specific tasks like 'VERBODEN: AANDEMAAKT VERSTREKKINGEN...' and 'CONTROLEER DE INFORMATIE VAN HET VERSTREKKINGVERZOEK EN IN...'.

Figuur 7 Patiëntenoverzicht en verstrekkingen


4.1 Verstrekkingverzoek toevoegen

Het (handmatig) toevoegen van een verstrekkingverzoek kan worden gedaan door de blauwe knop 'toevoegen' te kiezen (zie rode kader in Figuur 8).



Figuur 8 Patiënt overzicht

Een dialoog wordt getoond waar een receptnummer ingevoerd kan worden (Figuur 9). Het invoeren van een receptnummer is optioneel. Selecteer daarna de blauwe knop 'toevoegen'.



Figuur 9 Recept

Onderstaand scherm wordt vervolgens weergegeven (Figuur 10) en toegelicht in Tabel 1.

VERSTREKKINGSVERZOEK

Geneesmiddel*

Prescriptiecode (PRK)

1

2

Zoek een (genees)middel.

3

Code

3

Verpakkingsgrootte

4

Dosering*

5

VERIFIËREN

Toedieningswijze

6

Onbekende voorschrijver

7

Voorschrijver

8

9

Praktijk/Instelling voorschrijver

9

Hoeveelheid

10

eenheden

11

dagen

12

it

Start

dd-mm-jjjj

13

uu:mm

14

dd-mm-jjjj

15

uu:mm

16

Opmerkingen

17

Indicatie

18

19

Praktijk/Instelling

19

Receptnummer

20

ANNULEREN

VOLTOEIEN

VOLGENDE

Figuur 10 Verstrekkingverzoek

Onderstaand is de toelichtingstabel (Tabel 1) van Figuur 10 weergegeven.

Tabel 1 Toelichting Verstrekkingverzoek


Nr	Keuze	Toelichting
1	Geneesmiddelniveau*	Keuze uit Artikel, Prescriptiecode (PRK), Handelsproductcode (HPK) of Generieke Productcode (GPK). Per niveau kunnen andere zoektermen gebruikt worden, bijv. HPK en artikel kan gezocht worden op 'Metf 500 sandoz' of op PRK 'metf 500 mga'.
2	Geneesmiddel *	Bij 'geneesmiddel' kan het geneesmiddel worden opgezocht, door een (deel van) de naam in het zoekveld in te typen (in dit voorbeeld wordt 'Metformine tablet 500 mg' gezocht door de eerste 4 letters 'metf' in te voeren en op het zoek-icoontje te klikken. Hierdoor verschijnt een keuze lijstje waar het juiste geneesmiddel gekozen kan worden). Het is ook mogelijk om gerichter te zoeken, bijvoorbeeld door 'metf 500' in te voeren worden alleen metformine tabletten die 500mg bevatten, getoond.
3	Code	Dit is het ZI-nummer van het geselecteerde geneesmiddel (automatisch ingevuld)
4	Verpakkingsgrootte	De verpakkingsgrootte (bijvoorbeeld 90 stuks) wordt hier weergegeven van het geselecteerde geneesmiddel (automatisch ingevuld)
5	Dosering *	Hier kan de dosering(code) worden ingevuld (bijvoorbeeld 1d1t, zie Bijlage Coderingstabel). Door op de blauwe knop 'verifiëren' te klikken wordt de code vertaald (bijvoorbeeld 1 maal per dag 1 tablet)
6	Toedieningswijze	De toedieningswijze (bijvoorbeeld oraal, rectaal, etc) kan hier worden ingevuld
7	Onbekende voorschrijver	Indien de voorschrijver niet bekend is (of niet kan worden toegevoegd bij "nr. 8 Voorschrijver" kan deze toggle worden aangezet. Vervolgens kan er een keuze worden gemaakt uit; - Handverkoop (balie)

		- Onbekende voorschrijver - Onbekende voorschrijver ziekenhuis - Buitenlandse voorschrijver
8	Voorschrijver *	De voorschrijver kan op (deel van de) naam of AGB-code worden toegevoegd. De AGB-code kan eventueel worden gezocht op de site: https://www.vektis.nl/agb-register/zoeken Indien de voorschrijver niet bekend is, kan bij "nr. 6" worden gekozen voor "onbekende voorschrijver"
9	Praktijk/ instelling voorschrijver	De praktijk/instelling van de voorschrijver kan worden gekozen indien bij "nr. 8" een voorschrijver is ingevuld. De aan deze voorschrijver gekoppelde praktijk/instelling wordt zichtbaar.
10	Hoeveelheid – eenheden	De hoeveelheid – eenheid (bijvoorbeeld 90 stuks) kunnen worden ingevuld
11	Hoeveelheid – dagen	Er kan worden gekozen om het aantal dagen in te voeren (bijvoorbeeld 30 dagen)
12	Hoeveelheid – it	Het aantal herhalingen (iteraties) kan worden ingevuld
13	Startdatum	De startdatum van het geneesmiddel kan worden ingevuld (ddmmjjjj) of door de kalender te gebruiken
14	Starttijd	De starttijd kan worden ingevuld (bijvoorbeeld 08.00 uur)
15	Stopdatum	De stopdatum van het geneesmiddel kan worden ingevuld (ddmmjjjj) of door de kalender te gebruiken
16	Stoptijd	De stoptijd kan worden ingevuld (bijvoorbeeld 20.00 uur)
17	Opmerkingen	Eventuele opmerkingen kunnen als vrij tekstveld worden ingevuld
18	Indicatie	De indicatie kan hier worden ingevuld, door een (gedeelte van) de naam van de indicatie (bijvoorbeeld "dia") in te vullen verschijnt een keuzemenu (bijvoorbeeld "diabetes mellitus type 1")
19	Praktijk/ Instelling	De naam van de praktijk/instelling van de voorschrijver kan worden ingevuld (vrij invulbaar veld, bijvoorbeeld te gebruiken

		bij een praktijk die niet aan Vektis is gekoppeld)
20	Receptnummer	Eventueel kan het receptnummer worden ingevuld

* de velden met dit sterretje zijn verplichte velden


Vul de (verplichte) velden in (zoals bovenstaand beschreven) en klik vervolgens op groene knop “volgende” indien er nog een geneesmiddel ingevoerd dient te worden of op de blauwe knop “voltooien” indien alle geneesmiddelen van het voorschrift zijn ingevoerd. De ingevoerde geneesmiddelen worden weergegeven in (Figuur 11).



Figuur 11 Recept verstrekingsverzoek

De groene regel geeft het toegevoegde verstrekingsverzoek weer. Het symbool 'handje' (in Figuur 11) geeft aan dat het geneesmiddel handmatig is toegevoegd. Klik vervolgens op de groene knop 'opslaan'.

Onderstaand patiëntoverzicht (Figuur 12) wordt wederom geopend, waarbij het toegevoegde verstrekingsverzoek (bij 'Controleren') wordt weergegeven.



Figuur 12 Toegevoegde medicatie

Mochten er meerdere verstrekingsverzoeken toegevoegd dienen te worden (met verschillende externe receptnummers), herhaal dan bovenstaande stappen.


4.2 Medicatieverstrekkingen wijzigen

Het wijzigen van de medicatieverstrekkingen is mogelijk door op het verstrekkingsoverzicht te klikken (zie rode kader in Figuur 13 Medicatieoverzicht).



Figuur 13 Medicatieoverzicht – medicatie wijzigen

Hierdoor wordt onderstaand scherm geopend (Figuur 14). Dit scherm is opgebouwd uit details, medicatieafspraken, checks en verstrekkingen (rode in Figuur 14 kader). Het tabblad 'verstrekkingen' wordt geopend.




Figuur 14 Verstrekking bewerken

Het tabblad 'Verstrekkingen' is opgebouwd uit 'standaard instellingen' (groene blok) en de 'verstrekkingen' (blauwe blok). Bij de 'standaard instellingen' kunnen wijzigingen worden doorgevoerd welke van toepassing zijn op de standaard instellingen en niet op deze specifieke verstrekking. Een voorbeeld is dat de Metformine stadaard via de distributielijijn CF moet worden verstrekt, maar voor deze keer verstrek je de Metformine lokaal (bijvoorbeeld omdat de patiënt de Metformine tabletten nú nodig heeft).

Tevens kan de verstrekkingshistorie (zie **4.2.5 Verstrekkingshistorie**) worden ingezien.

Met opmerkingen [IH1]: Is nu medicatie i.p.v. medicatieafpraak, afbeelding zou in principe ook aangepast moeten worden

Het groene blok van de 'standaard instellingen' kan worden uitgeklaapt door op het pijltje-icoon te klikken, hierdoor wordt alle informatie zichtbaar, zie Figuur 15.



Figuur 15 Standaard instellingen

Bij de 'standaard instellingen' kunnen o.a. de distributielij, herhaalcondities (zie **4.2.6 Herhaalmedicatie**) en leveringsmethode worden gewijzigd. Klik na het aanbrengen van de gewenste wijziging(en) op de groene opslaan-knop.

Bij de 'Verstrekingen' (blauwe blok, Figuur 16) kunnen wijzigingen worden doorgevoerd welke van toepassing zijn op deze specifieke verstrekking, zoals o.a. de distributielij, startdatum, het aantal (eenheden) of het type (EU, TU of VU) worden gewijzigd.

VERSTREKKINGEN

TOEVOEGEN

Artikel

METFORMINE HCL TEVA TABLET 500MG

Distributielijn

Lokaal assortiment

Startdatum gebruik

30-03-2023

Duur

90 dagen

Eenheden

180 st

Verpakkingen

2

Doseer Type

TU

Betaalwijze

Declareren

Leverlijn

Balie

Verwachte leverdatum

dd-mm-jjjj

Standaard

Annuleer

Vastzetten

Opmerkingen

Vastzet type

Vastzet opmerkingen

VERSTREKKINGEN

TOEVOEGEN

Artikel

METFORMINE HCL TEVA TABLET 500MG

Distributielijn

Lokaal assortiment

Startdatum gebruik

30-03-2023

Duur

90 dagen

Eenheden

180 st

Verpakkingen

2

Type verstrekking

TU

Betaalwijze

Declareren

Leverlijn

Balie

Verwachte leverdatum

dd-mm-jjjj

Standaard

Vastzetten

Reset

Annuleer

Opmerkingen

Vastzet type

Vastzet opmerkingen

Met opmerkingen [IH2]: Aanpassingen rechtsboven in het scherm waardoor het mogelijk is om de Logging van de verstrekking te bekijken

Figuur 16 Verstrekkingen

Door de toggle 'standaard' te activeren, worden de gemaakte wijzigingen overgenomen in de 'standaard instellingen'.


Toevoegen kopje: "Bekijk log" optie (rechtsboven in het verstrekkingen blok)

4.2.1 Preferentie

Indien er gekozen wordt voor een niet-preferent artikel, dan kan dit kenbaar gemaakt worden door de toggle 'vastzetten' aan te zetten en van "vastzet type" te kiezen voor medisch, logistiek of financiële noodzaak. Eventueel kan er een 'vastzet opmerking' bij worden getypt.

4.2.2 Wijzigen distributielij

Het wijzigen van de distributielij kan worden gedaan door achter de distributielij op het "pennetje" icoon (rode kader in Figuur 17) te klikken.




Figuur 17 Distributielij wijzigen

Hierdoor wordt onderstaand scherm weergegeven (Figuur 18). Bovenin het scherm kunnen de volgende toggles worden toegepast;

- Lokaal: geeft aan of het artikel lokaal aanwezig is (met of zonder voorraad)
- Vergoed: geeft inzicht of het artikel wel (groen euroteken) of niet (rood euroteken) wordt vergoed door de zorgverzekeraar
- Preferent: geeft aan of het artikel preferent is (symbool met 'P')
- Voorraad: geeft aan of het artikel op voorraad is (groene doos, zie **hoofdstuk 0**)

- Voorraad)



Figuur 18 Beheer verstrekkingen

Selecteer het betreffende artikel en klik op de groene knop 'ok'.
Na het opslaan keer je terug naar het medicatieoverzicht van de patiënt. Hier zie je de gewijzigde verstrekking weergegeven (zie rode kader bij Figuur 19).



Figuur 19 Gewijzigde medicatie


Het aanbrengen van wijzigingen is mogelijk totdat de bijbehorende controles zijn afgehandeld en de medicatie gereed is voor 'afleveren'. Hierna is het niet meer mogelijk om een wijziging door te voeren en kan de medicatie alleen nog worden gestopt/verwijderd (zie **4.2.9 Geen artikel gevonden**)

Indien er geen artikel is gevonden laat het systeem dit zien door de melding 'geen artikel geselecteerd' (zie rode kader in Figuur 33). Aan de rechterzijde bij 'controles' wordt hiervoor een check weergegeven (zie rode kader in Figuur 33).



Figuur 33 Geen artikel gevonden

Door op deze check te klikken wordt onderstaand scherm weergegeven (Figuur 34).



Figuur 34 Selecteer medicijn

Het betreffende medicijn kan worden gezocht door (een gedeelte van) de naam van het medicijn en eventuele sterkte en merk in te typen. Klik vervolgens op het loop-symbool om te zoeken waardoor verschillende suggesties worden weergegeven zoals in onderstaand voorbeeld (Figuur 35).

SELECTEER MEDICIJN

Medicijn kon niet worden gevonden. Selecteer het juiste type en zoek het gewenste medicijn.

Type

Artikel

Medicijn*

livocab

13625306 LIVOCAB OOGDRUPPELS 0,5MG/ML FLACON 4ML 1 dr vp x 4 ml = 4 ml

14296500 LIVOCAB NEUSSPRAY 0,5 MG/ML 1 flac x 15 ml = 15 ml

ANNULEREN DOORSTUREN VOLTOOIEN

Figuur 35 Selecteer medicijn - juiste medicijn

Selecteer het juiste medicijn en klik vervolgens op de groene knop 'voltooien'. Het medicijn wordt vervolgens toegevoegd (Figuur 36).

CONTROLEREN 2 TOEVOEGEN

LEVOCABASTINE OOGDRUPPELS 0,5MG/ML FL 4ML 302DR 1 ml = 13 dagen 13-04-2023 09:40 AMG FUHLER	LIVOCAB OOGDRUPPELS 0,5MG/ML FLACON 4ML 302DR 4 ml = 13 dagen ► 10-04-2023 ■ 23-04-2023 CF Odessa	3
--	--	----------

Figuur 36 Medicijn toegevoegd

Medicatieverstrekking annuleren).

4.2.3 Voorraad

Bij 'Beheer verstrekking' kunnen diverse filters worden toegepast om te controleren welk artikel voorradig is. In onderstaand voorbeeld (zie Figuur 20) zijn de filters 'lokaal' en 'voorraad' toegepast waardoor te zien is dat er 3 soorten Metformine 500 mg tabletten op voorraad zijn in de apotheek. Het symbool groene doos  laat zien dat het betreffende artikel op voorraad is (zie tevens rode kader in Figuur 20). Door met de muis over het symbool groene doos  te bewegen, wordt de voorraad hoeveelheid weergegeven (in onderstaand voorbeeld 250 stuks).

DETAILS

MEDICATIEAFSPRAAK

VERSTREKKINGEN

BEHEER VERSTREKKING

Lokaal

Vergoed

Preferent

Voorraad

Artikel	Distributie lijn	Beste keus
METFORMINE HCL MYLAN TABLET 500MG	6 STRIP x 15 st = 90 st	Lokaal
METFORMINE HCL AUROBINDO TABLET 500MG	9 STRIP x 10 st = 90 st	Lokaal
METFORMINE HCL TEVA TABLET 500MG	9 STRIP x 10 st = 90 st	Lokaal 250

Handmatige selectie verstrekking

Artikelnaam

Distributie lijn

ANNULEREN

OK

Figuur 20 Voorraad (groene doos)

4.2.4 Geen (lokale) voorraad

Indien er wordt gekozen voor een artikel dat niet voorradig is, kan deze worden besteld, als er een 'Lokaal inkopen distributielijijn' als fallback is ingesteld. Het betreffende artikel wordt bij het patiëntenoverzicht weergegeven onder het kopje 'Inkopen' (zie rode kader in Figuur 21).


CONTROLLEREN		TOEVOEGEN	
METFORMINE HCL MYLAN TABLET 500MG 1d11 19-06-2022 11:56 P TUBBERGEN	METFORMINE HCL SANDOZ TABLET FILMOMHULD 500... 1d11 90 st = 90 dagen LOKAAL	 	☐
SIMVASTATINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 40MG 1d11 19-06-2022 11:53 P TUBBERGEN	SIMVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 40MG 1d11 90 st = 90 dagen LOKAAL	 	☐

Figuur 21 Inkopen

De status van het betreffende artikel, wordt deze na het bijboeken van de (patiënt specifieke)inkoop, automatisch aangepast naar 'picken' (zie *Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.*).


4.2.5 Verstrekkingshistorie

Bij 'Historie' (zie rode kader bij Figuur 22) kan de verstrekkingshistorie worden ingezien van alle verstrekkingen geleverd op dezelfde medicatieafpraak.



Figuur 22 Historie


Onderstaand scherm wordt weergegeven (Figuur 23).




Figuur 23 Voorgaande verstrekkingen

4.2.6 Herhaalmedicatie

Indien een verstrekingsverzoek (recept) digitaal wordt ontvangen door de apotheek, wordt de informatie over (het aantal) herhalingen automatisch meegestuurd. Bij de medicatie staat een symbool van een stethoscoop weergegeven. Indien het symbool een rode kleur heeft (zoals in Figuur 24) dan betekent dit dat er geen herhalingen (meer) zijn. Is het symbool groen (Figuur 25) dan kan het artikel worden herhaald.



Figuur 24 Symbool stethoscoop rood



Figuur 25 Symbool stethoscoop groen

De herhalingscondities staan weergegeven bij de standaard instellingen in het groene vak (zie Figuur 26) en kunnen verder worden ingezien of gewijzigd worden door achter het geneesmiddel te klikken op het pijltje-icoon (zie rode kader bij Figuur 26).



Figuur 26 Herhaalcondities (korte weergave)

Hierdoor wordt bovenstaand scherm verder uitgeklaapt en wordt Figuur 27 weergegeven.



Figuur 27 Herhaalcondities (volledige weergave)


Bij herhaalcondities kan een keuze worden gemaakt uit;

- Max. herh. (maximaal aantal herhalingen)
- Max. hoev. (maximale hoeveelheid medicatie herhalen)
- Einddatum (herhalen tot een bepaalde datum)
- Oneindig (herhalen zonder limitatie)
- Geen herhalen (eenmalig, niet herhalen)

Afhankelijk van boven gemaakte keuze kunnen de velden maximale hoeveelheid, maximaal herhalen, eenheden en duur (dagen) worden ingevuld.
Klik vervolgens onderin op de groen knop "opslaan".


4.2.7 Herhaling toevoegen

Indien er bij de herhaalcondities is weergegeven dat er nog een of meerdere herhalingen zijn toegestaan, dan is de blauwe knop 'toevoegen' blauw weergegeven (indien er geen herhalingen (meer) zijn dan is deze knop grijs), zie Figuur 28.



Figuur 28 Herhaling door 'toevoegen'

Door op de blauwe knop 'toevoegen' te klikken, wordt de verstrekking/ herhaling (in het blauwe blok) weergegeven, zie rode kader in Figuur 29.




Figuur 29 Toevoegen verstrekking/herhaling

Eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld de distributielijn, de eenheid of de leverlijn) kunnen worden doorgevoerd. Klik vervolgens op de groen knop 'opslaan'.

De vorige uitgifte in dit voorbeeld betrof een tweede uitgifte. De verstrekking/ herhaling die nu wordt aangemaakt wordt automatisch herkent als vervolguitgifte (VU). Ook wordt het aantal iteraties verrekend.

4.2.7.1 GDS (Baxter) of Central filling

Indien de medicatie via een GDS - geneesmiddel distributiesysteem - ("Baxter") of Central filling verloopt, kan dit worden ingesteld bij het beheer van de verstrekking, zie Figuur 30). De juiste distributielijn (bijvoorbeeld CF of Baxter) moet zijn ingesteld.



Figuur 30 Verstrekkingen

Door achter 'distributielijn' op het blauwe "pennetje" te klikken wordt onderstaand scherm weergegeven (Figuur 31).

DETAILS

MEDICATIEAFSPRAAK

VERSTREKKINGEN

BEHEER VERSTREKKING

☒ Lokaal
 ☐ Vergoed
 ☐ Preferent
 ☐ Voorraad

Artikel		Distributie lijn	Beste keus
SIMVASTATINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 20MG	1 POT x 250 st = 250 st	CF	
SIMVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 20MG	3 STRIP x 10 st = 30 st	CF	
SIMVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 20MG	9 STRIP x 10 st = 90 st	CF	
SIMVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 20MG	9 STRIP x 10 st = 90 st	Lokaal	
SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 20MG	6 STRIP x 15 st = 90 st	Lokaal	
SIMVASTATINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 20MG	6 STRIP x 15 st = 90 st	Lokaal	
ZOCOR TABLET 20MG	2 STRIP x 14 st = 28 st	Lokaal	

Handmatige selectie verstrekking


Figuur 31 Beheer verstrekking

Kies vervolgens het gewenste artikel onder de juiste distributielij (in dit voorbeeld distributielij CF). Klik vervolgens op de groene knop 'ok'.

Indien de GDS (baxter)medicatie voor de eerste keer moet worden geleverd, dient rekening gehouden te worden met de datum waarop de patiënt de eerste GDS (baxter)medicatie zal ontvangen. Tot deze datum dient de apotheek ter overbrugging medicatie te leveren. Deze medicatie dient handmatig te worden toegevoegd, zie hiervoor *Fout! Verwijzingsbron niet gevonden*. *Fout! Verwijzingsbron niet gevonden*.

4.2.8 Waarneemmedicatie invoeren

Het invoeren van waarneemmedicatie kan door de medicatie handmatig toe te voegen (zie *Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.*) en bij 'standaard in stellingen' de toggle "niet verstrekken" te activeren (zie rode kader bij Figuur 32). Klik op de groene knop 'opslaan'.



Figuur 32 Niet verstrekken


4.2.9 Geen artikel gevonden

Indien er geen artikel is gevonden laat het systeem dit zien door de melding 'geen artikel geselecteerd' (zie rode kader in Figuur 33). Aan de rechterzijde bij 'controles' wordt hiervoor een check weergegeven (zie rode kader in Figuur 33).




Figuur 33 Geen artikel gevonden

Door op deze check te klikken wordt onderstaand scherm weergegeven (Figuur 34).



Figuur 34 Selecteer medicijn

Het betreffende medicijn kan worden gezocht door (een gedeelte van) de naam van het medicijn en eventuele sterkte en merk in te typen. Klik vervolgens op het loop-symbool om te zoeken waardoor verschillende suggesties worden weergegeven zoals in onderstaand voorbeeld (Figuur 35).



Figuur 35 Selecteer medicijn - juiste medicijn


Selecteer het juiste medicijn en klik vervolgens op de groene knop 'voltooien'. Het medicijn wordt vervolgens toegevoegd (Figuur 36).

^ CONTROLEREN 2		+ TOEVOEGEN	
LEVOCABASTINE OOGDRUPPELS 0,5MG/ML FL 4ML 	LIVOCAB OOGDRUPPELS 0,5MG/ML FLACON 4ML		
3D2DR 1 ml = 13 dagen	3D2DR 4 ml = 13 dagen		
13-04-2023 09:40  AMG FUHLER	► 10-04-2023 ■ 23-04-2023 CF Odessa  		 3

Figuur 36 Medicijn toegevoegd


4.3 Medicatieverstrekking annuleren of stoppen

Het annuleren van medicatie is mogelijk door op het betreffende verstrekkingsoverstel in de 'witte' kolom te klikken (zie rode kader in Figuur 37).




Figuur 37 Medicatieoverzicht

Hierdoor wordt onderstaand scherm weergegeven. Activeer in het tabblad 'verstrekkingen' de toggle 'annuleer' (zie rode kader Figuur 38) en klik vervolgens op de groene knop 'opslaan'.



Figuur 38 Verstrekking annuleren

Het artikel wordt in het patiëntoverzicht toegevoegd bij 'Historie' met status 'geannuleerd' (zie Figuur 39).



Figuur 39 Verstrekking geannuleerd


4.3.1 Medicatieverstrekking stoppen

Het stoppen van de medicatieverstrekking is mogelijk door op het betreffende verstrektingsvoorstel in de 'witte' kolom te klikken (zie rode kader in Figuur 40).



Figuur 40 Medicatieoverzicht

Hierdoor wordt onderstaand scherm weergegeven (Figuur 41).



Figuur 41 Medicatieafspraak stoppen

Klik in het tabblad 'medicatieafspraak' op de rode knop 'stop'. Er wordt om een bevestiging gevraagd, klik vervolgens op de groene 'ja' knop.

4.3.2 Medicatieafspraak verwijderen

Het verwijderen van een medicatieafspraak is mogelijk door op de betreffende medicatieafspraak in de 'blauwe' kolom te klikken (zie rode kader in Figuur 42).



Figuur 42 Medicatieafspraak verwijderen

Hierdoor wordt onderstaand scherm weergegeven (Figuur 43).

VERSTREKKINGSVERZOEK

Geneesmiddel*

Artikel

IBUPROFEN TEVA TABLET OMHULD 600MG

Code

17103320

Verpakkingsgrootte

30

Dosering*

2d1t

Toedieningswijze

Voorschrijver

MEH DECKERS

Praktijk/Instelling voorschrijver

Hoeveelheid

50 st 25 dagen it

Start

dd-mm-jjjj

uu:mm

Stop

dd-mm-jjjj

uu:mm

Opmerkingen

VOLLEDIG VERWIJDEREN


ANNULEREN

Figuur 43 Medicatieafspraak verwijderen

Klik op de rode knop 'volledig verwijderen'. Er wordt om een bevestiging gevraagd, klik vervolgens op de groene 'ja' knop.

4.4 Medicatiebewaking en controles

Aan de rechterzijde van het patiëntoverzicht (Figuur 44) worden de bewakingssignalen en controles weergegeven, zie onderstaand in het rode kader.



Figuur 44 Patiëntoverzicht

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Controles, zoals;
 - contra-indicaties
 - dubbel-medicatie
 - interacties
 - handmatig aangemaakt verstrekingsverzoek (deze dient door 2 gekwalificeerde personen te worden gecontroleerd)
 - waarschuwing allergie
 Een voorbeeld wordt onderstaand toegelicht.
- Verstrekingsverzoek controle
 - Een voorbeeld wordt onderstaand toegelicht.
- Leveringscontroles, zoals;
 - Eerste uitgifte gesprek
 - Print VI-folder
 - Vraag gewicht na
 - Niet verzekerd
 Een voorbeeld wordt onderstaand toegelicht.

4.4.1 Controles

Een voorbeeld van een controle is onderstaande interactie. Door op de betreffende controle-check te klikken wordt deze weergegeven zoals onderstaand voorbeeld in Figuur 45.

WAARSCHUWING INTERACTIE

DOXY DISP TEVA TABLET 100MG

DOXYCYCLINE DISP TABLET 100MG + FERROFUMARAAT TABLET 200MG

Bij gelijktijdig innemen met ijzer vermindert de absorptie van het tetracycline.

- DOXYCYCLINE

De absorptie van doxycycline wordt dusdanig sterk vermindert dat een inname-interval geen zin heeft

 - staak tijdelijk het ijzer
 - Als dit niet kan
 - vervang doxycycline
 - Als doxycycline wordt vervangen door een ander tetracycline, zie hieronder bij overige tetracyclines
- OVERIGE TETRACYCLINES

 - Ijzer in gewoon preparaat
 - vertel de patiënt dat het tetracycline ten minste 2 uur VOOR of 4 uur NA ijzer moet worden ingenomen
 - geef interactiefolder I-20 mee
 - Ijzer in preparaat met gereguleerde afgifte
 - vervang het preparaat met gereguleerde afgifte door een gewoon preparaat en volg het innameschema van gewoon preparaat

Opmerkingen

ANNULEREN

Onderdrukken voor:

Eén jaar

VERZ. APOTHEKER

AKKOORD

Figuur 45 Interactie

Per check kunnen eventuele opmerkingen worden toegevoegd. Indien akkoord kan de groene knop 'akkoord' worden geklikt.

Door op de blauwe knop 'verz. apotheker' te klikken, wordt het (actie)punt naar de apotheker verstuurd en wordt deze weergegeven op de werklijst van de apotheker (zie *Fout!*

Verwijzingsbron niet gevonden. **5Balie**

Vanuit het menu , bij Patiënten/ Balie, wordt de afleverinformatie weergegeven. Wanneer de medicatie gereed is, ofwel gecontroleerd en gepickt is, is er bij 'patiënt picken' een opslaglocatie (track & trace locatie) aan de medicatie gekoppeld.


Indien de betreffende patiënt aan de balie staat om zijn medicatie op te halen, kan bij 'balie' de betreffende patiënt worden opgezocht (Figuur 78Figuur 78). Het zoeken kan op geboortedatum of achternaam (of een gedeelte daarvan).

Balie

Zoeken op achternaam of geboortedatum (ddmmjjjj)

Figuur 78 Balie

Onderstaand scherm wordt weergegeven (**Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**).



Figuur 79 T&T locatie

Door op de betreffende patiënt te klikken wordt het patiëntoverzicht weergegeven. Bij de medicatie (rode kader in Figuur 80) wordt de opslaglocatie (track&trace) weergegeven, in dit voorbeeld U020.



Figuur 80 Opslaglocatie

“eindcontroles”).

De betreffende check wordt standaard voor één jaar onderdrukt, indien gewenst kan deze termijn worden aangepast (geen/ 3 maanden/ 6 maanden/ 1 jaar/ 2 jaar).

4.4.2 Verstrekkingverzoek controle

Bij iedere verstrekking wordt een verstrekkingverzoek controle gegenereerd, welke is bedoeld voor de controle van de betreffende verstrekking (rechts in Figuur 46) in vergelijking met het verstrekkingverzoek (links in Figuur 46). Gewijzigde of ontbrekende gegevens worden omcirkeld (zie in onderstaand voorbeeld de hoeveelheid van de verstrekking).

VERSTREKKINGSVERZOEK CONTROLE

VERSTREKKINGSVERZOEK

ETORICOXIB TABLET FO 30MG

Datum: 14-02-2023 11:05 Voorschrijver: AMG FUHLER (01028195)

Dosering: 1D1T Toedieningswijze: 1 per dag 1 tablet

Opmerkingen:

Hoeveelheid: 30 STUK 30 dagen

Start gebruik: 14-02-2023 00:00 Stop: 16-03-2023 00:00

Indicatie:

ANNULEREN

VERSTREKKING

ETORICOXIB TEVA TABLET FILMOMHULD 30MG (30 st)

Voorschrijver*: AMG FUHLER

Dosering*: 1D1T Toedieningswijze: ORAAL

1 maal per dag 1 tablet

Hoeveelheid*: 60 st 30 dagen Distributie methode: CF Odessa

Start gebruik: 14-02-2023 00:00 Stop: 16-03-2023 00:00

Indicatie: Zoeken

AKKOORD

Figuur 46 Verstrekkingverzoek controle

Eventuele wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Indien akkoord kan de blauwe knop 'akkoord' worden geklikt.

4.4.3 Leveringscontrole

Een voorbeeld van een leveringscontroles is de 'eerste uitgifte folder'. Bij de eerste uitgifte kan er een eerste uitgifte folder (VI-folder) worden geprint (zie linkerkant van Figuur 47).

CONTROLEER EERSTE UITGIFTE FOLDER

Print VI-folder.

Opmerkingen

ANNULEREN

PRINTEN

AKKOORD

Bètablokkers

UW MEDICIJN IN HET KORT:

- ☐ Helpt bij hoge bloeddruk, hartklopping en hartkwalmschillen. Helpt ook bij migraine.
- ☐ Meestal voor lange tijd gebruiken, niet vaak af.
- ☐ Hoe snel de medicijnen helpen is voor elke ziekte anders. Soms meteen, soms na een aantal weken.
- ☐ Het kan een ongewenste werking hebben met andere middelen die u gebruikt. Informeer voor gebruik eerst bij uw apotheker.
- ☐ Bovenliggen, zoals vermoeidheid en duizeligheid, gaan meestal na een paar weken over.

WERKING

Hoe helpt dit medicijn?

Dit medicijn is een bètablokker en maakt uw hartslag langzamer. Daarom helpt het bij hoge bloeddruk, hartklopping, langzaam en onregelmatig hartkloppen. U kunt dit medicijn om verschillende redenen krijgen, omdat u of hart- en vaatziekten heeft, of omdat u moet zorgen dat u geen hart- en vaatziekten krijgt. Mensen met migraine gebruiken deze medicijnen omdat ze dan minder vaak migraine hebben.

GEBRUK

Hoe lang moet u dit medicijn gebruiken?

Meestal moet u dit medicijn heel lang gebruiken, soms wel jaren. Als u wilt stoppen met dit medicijn, moet u dat eerst eerst dan uw dokter vragen. U moet altijd langzaam aan stoppen met deze medicijnen.

Wanneer merkt u dat dit medicijn helpt?

Wilt u merkt van dit medicijn is voor elke ziekte anders. Als u een hartkwalmschillen heeft, dan helpen de medicijnen u na een paar uur. Heeft u hoge bloeddruk? Dan kan de dokter na twee tot vier weken merken of het medicijn bij u goed werkt. U kunt het niet goed voelen of uw bloeddruk lager is geworden. Ook als u migraine heeft, kunt u het direct als merken van dit medicijn.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Bètablokkers zijn meestal tabletten. Neem ze in met water. Als u één tablet per dag in moet nemen dan kunt u deze tablet het beste 's ochtends innemen. Maak u meerdere tabletten per dag innemen? Doe dit dan met een voorstel u goed tegen omstandigheden minder goed kunt helpen.

Medicijn vergeten?

Lees de toelichting op <http://www.docofarm.nl> om te weten wat u moet doen.

Hoe moet u dit medicijn bewaren?


Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.

Figuur 47 Eerste Uitgifte Folder

Door op de blauwe knop 'printen' te klikken, wordt de VI-folder uitgeprint (zie voorbeeld rechts in Figuur 47). Eventuele opmerkingen kunnen worden toegevoegd. Indien uitgevoerd dan kan de groene knop 'akkoord' worden geklikt.

4.4.4 Zelf controle-check toevoegen

Het is mogelijk om zelf een controle-check toe te voegen, bijvoorbeeld om bij het afleveren van het artikel nog het juiste gewicht te controleren of om na te vragen of de dosering bewust is gewijzigd sinds de vorige verstrekking. Het toevoegen van een controle-check kan worden gedaan door een opmerking te typen in de verstrekking, zie onderstaand voorbeeld in het rode kader in Figuur 48.



Figuur 48 Zelf controle-check toevoegen

De betreffende controle-check wordt toegevoegd aan de leveringscontroles, zie Figuur 49



Figuur 49 Toegevoegde leveringscontrole

Door op de betreffende check te klikken, wordt deze weergegeven, zie onderstaand voorbeeld (Figuur 50).




Figuur 50 Verstrekking met opmerkingen

Eventuele opmerkingen kunnen worden toegevoegd. Indien uitgevoerd dan kan de groene knop 'akkoord' worden geklikt.

4.4.5 Filter bewakingssignalen en controles

Het rode vakje achter de medicatie (zie rode kader in Figuur 51) geeft aan hoeveel bewakingssignalen en controles er per artikel aanwezig zijn, deze worden aan de rechterzijde weergegeven. Indien er meerdere artikelen gecontroleerd dienen te worden, is het mogelijk om te filteren per artikel door op dit rode vakje te klikken. Er verschijnt een blauw kader om het artikel (in onderstaand voorbeeld staat een blauw kader om de Metformine). Door dit filter toe te passen staan bij de controles aan de rechterzijde de bewakingssignalen en controles van dit artikel (in dit voorbeeld alleen van de Metformine) weergegeven.




Figuur 51 Medicatiebewaking filter

Indien alle medicatiebewaking en controles zijn afgehandeld, wordt deze naar 'voltooid' verplaatst.


4.5 Picken

Vanuit het menu , bij Leveren/ Patiënt Picklijst, worden de patiënten weergegeven waarvan de medicatie reeds is gecontroleerd en welke gereed zijn om 'gepickt' te worden (zie Figuur 52).



Figuur 52 Patiënt Picken


1. De betreffende recepten kunnen worden gepickt door op de betreffende regel te klikken.
2. Achter de patiënt zijn eventuele symbolen aangegeven, zie onderstaande symbolen en hun betekenis (Figuur 53).



Figuur 53 Symbolen picklijst


3. De (patiënten)lijst kan worden gefilterd op bovenbeschreven symbolen.

Door op de betreffende patiënt te klikken (zie rode kader in Figuur 52) wordt onderstaand scherm weergegeven (Figuur 54).



Figuur 54 Patiënt Picken - medicatie

Voor de patiënt in bovenstaand voorbeeld (Dhr. Test) dient 'Metformine HCL Teva tablet 1000 mg 180 stuks' te worden gepickt. De locatie van dit artikel wordt weergegeven, in dit voorbeeld in E03, dit is ladenkast blok E lade 03). Daarnaast wordt de huidige voorraad van fit artikel weergegeven (in dit voorbeeld 350 tabletten). Door dit artikel te picken uit de lokale voorraad en te scannen zal deze regel (rode kader in Figuur 55) groen worden.



Patiënt Picken > Patiënt

Scan een barcode

TE DOEN

METFORMINE HCL TEVA TABLET 1000MG	90 st	180 st	180 st	Gepickt	E03 (350)	
-----------------------------------	-------	--------	--------	---------	-----------	--

OVERIG

Geen resultaten in deze groep


ANNULEREN PRINT GEREED

Figuur 55 Patiënt Picken - compleet

In bovenstaand voorbeeld dienen 180 stuks geleverd te worden. Achter het artikel (in dit voorbeeld 'Metformine') staat de verpakkingsgrootte weergegeven (in dit voorbeeld 90 stuks), er dienen dus 2 verpakkingen gepickt en gescand te worden. Klik vervolgens op de blauwe knop 'gereed'.


4.5.1 Nalevering/ bestellen

Indien er minder voorraad aanwezig is (in dit voorbeeld 90 stuks i.p.v. 180 stuks), zal de regel een oranje kleur (Figuur 56) krijgen omdat de levering niet compleet is.



Figuur 56 Levering niet compleet

Door op het 'plus' icoon (rode kader in Figuur 56) te klikken, wordt er een regel toegevoegd voor de overige (in dit voorbeeld 90) stuks en wordt 'bestellen' gekozen (zie rode kader in Figuur 57).



Figuur 57 Bestellen


In het patiëntoverzicht (zie Figuur 58) is zichtbaar dat de 90 stuks Metformine tabletten gereed zijn voor afleveren en de nalevering van 90 stuks Metformine tabletten worden weergegeven bij 'inkopen'.



Figuur 58 Inkopen (bestellen)


4.5.2 Batch/ charge

Bij het scannen van de juiste verpakking(en) zal de batch (chargenummer) en houdbaarheid van het artikel worden weergegeven, achter de blauwe 'B' zoals in het rode kader in Figuur 59.



Figuur 59 Batch artikel

Eventueel kan de batch handmatig worden toegevoegd door op de blauwe 'B' te klikken. Onderstaand scherm wordt weergegeven (Figuur 60).




Figuur 60 Toevoegen charge

Klik vervolgens op de groene 'ok' knop.

4.5.3 Onjuist artikel


Indien er een onjuist artikel (en/of onjuiste verpakkingsgrootte) wordt gepickt, wordt dit aangegeven door de melding: 'dit artikel is niet bekend bij deze patiënt' (zie Figuur 61). Het juiste artikel (en/of onjuiste verpakkingsgrootte) dient gepickt te worden.



Figuur 61 Onjuist artikel gepickt


4.5.4 Substitueren artikel

Indien een artikel gesubstitueerd dient te worden (bijvoorbeeld wanneer een bepaald merk niet voorradig is en je een ander artikel gaat picken), kan je door middel van het symbool in het rode kader in Figuur 62, een ander artikel scannen.



Figuur 62 Substitueren artikel

Onderstaand scherm wordt weergegeven (Figuur 63).



Figuur 63 Ander artikel picken

Het betreffende artikel kan nu gescand worden. Klik vervolgens op de blauwe 'gereed' knop.

4.5.5 Opslaglocatie


Voor de gepickte artikel(en) kan vervolgens een opslaglocatie (track&trace) worden gekozen. Onderstaand scherm wordt weergegeven (**Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**).

Figuur 64 Opslaglocatie

Er wordt automatisch een opslaglocatie voorgesteld, in dit voorbeeld locatie U020. Hierbij wordt momenteel geen rekening gehouden met de grootte van de verpakking(en). De opslaglocatie kan eventueel handmatig worden gewijzigd. Indien er meerdere artikelen zijn voor een patiënt, dan worden deze in dezelfde opslaglocatie geplaatst. Klik op de groene knop 'ok'.

4.5.6 Etiketten

Na het picken van de juiste artikelen worden automatisch de benodigde etiket(ten) voor de verpakking(en) geprint. Indien de medicatie via de medicijnkluis geleverd moet worden of bezorgd moet worden, worden hiervoor automatisch extra (bezorg)etiketten geprint. Na het kiezen van de opslaglocatie zal de patiënt van 'te doen' naar 'voltooid' worden verplaatst (Figuur 65**Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**).



The screenshot shows a web interface titled 'Patiënt Picken'. At the top, there is a 'Filter' dropdown menu. Below it, there are two sections: 'TE DOEN' (To Do) and 'VOLTOOID' (Completed). The 'VOLTOOID' section is expanded, showing a list of three items, each with a circled '1' icon to its right. The items are blurred, but they appear to be medication names or codes.

Figuur 65 Patiënt Picken - voltooid


4.5.7 Slotje

Indien een actie/patiënt momenteel door een collega wordt verwerkt, dan wordt er voor de patiënt een symbool slot  weergegeven (zie Figuur 66).



Figuur 66 Slotje


Mocht je toch toegang wensen tot deze actie/patiënt, dan kan het slotje geunlocked worden. Door op de betreffende patiënt te klikken (rode kader in Figuur 67) wordt onderstaand scherm weergegeven. Klik op de blauwe knop 'unlock'.



Figuur 67 Unlock slotje

4.5.8 Picken vanuit patiëntendossier

Het is ook mogelijk om vanuit het patiëntendossier naar 'picken' te gaan. In onderstaand voorbeeld (Figuur 68) zijn 2 artikelen weergegeven die gepickt dienen te worden.



Figuur 68 Picken vanuit patiëntendossier

Door op het symbool naast 'picken' (zie rode kader in Figuur 68) wordt onderstaand pick-scherm geopend (Figuur 69). Zie **hoofdstuk 4.5 Picken**.

Patiënt Picken > Patiënt

JM Mulder

♂ 63 jaar 01-01-1960

TE DOEN

IBUPROFEN TEVA TABLET 400MG OT

20 st

30 st

st

B05 (300)

METFORMINE HCL TEVA TABLET 500MG

90 st

180 st

st

A4 (765)

Figuur 69 Pick-scherm

4.6 Uitleveren

Indien het artikel gepickt is, is het gereed om uit te leveren aan de patiënt. Het artikel is op de “verstrekkingen” verplaatst naar het kopje ‘uitleveren’ (zie rode kader bij Figuur 70).

Werklijst Assistent		
Zoeken op achternaam of geboortedatum (ddmmjjjj)		
A.B. Testpatiënt ♂ 27 jaar 14-07-1994		
E.C. Zeem ♂ 81 jaar 05-11-1940		
K Klaassens ♀ 48 jaar 24-12-1973		
UITLEVEREN		
M Boom	Distributie methode 5x Lokaal	Leveringsmethode 4x Balie / Bezorger
J de Vries	Distributie methode 4x Lokaal	Leveringsmethode 4x Balie
TI Simons	Distributie methode 23x Lokaal	Leveringsmethode 20x Balie / 2x Bezorger / Vervoerder

Figuur 70 Uitleveren

Door op de naam van de betreffende patiënt te klikken (rode kader in Figuur 70) wordt onderstaand patiëntoverzicht weergegeven. De verstrekking wordt onder ‘Afleveren’ weergegeven (linker rode kader in Figuur 71).

VOLTOOIEN		TOEGEGEN		CONTROLES	
MACROGOL POEDER V DRANK 40 1 x per dag 4 gram 10-01-2023 14:30 10-01-2023 14:30 10-01-2023 14:30		MACROGOL AUROBINDO POR V DRANK SACHET 40 1x 1x 10-01-2023 10-01-2023 10-01-2023		Er zijn geen controles LEVERINGSCONTROLES Er zijn geen controles CONTROLEER EERSTE UITGIFTE FOLDER MACROGOL AUROBINDO POR V DRANK SACHET 40 Print folder: EERSTE UITGIFTE GESPREK MACROGOL AUROBINDO POR V DRANK SACHET 40 Toe: Eerste uitgifte gesprek VERSTREKKINGEN MET OPMERKINGEN MACROGOL AUROBINDO POR V DRANK SACHET 40 gewicht navigeren	
MACROGOL POEDER V DRANK 40 1 x per dag 4 gram 10-01-2023 14:30 10-01-2023 14:30 10-01-2023 14:30		MACROGOL AUROBINDO POR V DRANK SACHET 40 1x 1x 10-01-2023 10-01-2023 10-01-2023		Er zijn geen controles LEVERINGSCONTROLES Er zijn geen controles CONTROLEER EERSTE UITGIFTE FOLDER MACROGOL AUROBINDO POR V DRANK SACHET 40 Print folder: EERSTE UITGIFTE GESPREK MACROGOL AUROBINDO POR V DRANK SACHET 40 Toe: Eerste uitgifte gesprek VERSTREKKINGEN MET OPMERKINGEN MACROGOL AUROBINDO POR V DRANK SACHET 40 gewicht navigeren	

Figuur 71 Afleveren

In bovenstaand voorbeeld zie je dat het artikel klaar ligt op locatie 183 (middelste rode kader in Figuur 71). De bijbehorende leveringscontroles (rechter rode kader in Figuur 71) dienen vervolgens afgehandeld te worden, zie *Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.*

4.7 Nazending

Indien een artikel niet (volledig) kan worden geleverd (bijvoorbeeld omdat het artikel niet voorradig is), wordt het artikel onder het kopje “inkopen” gezet. Dit betekent dat het betreffende artikel in bestelling staat bij de betreffende leverancier. Indien de leverancier heeft teruggekoppeld naar F6 dat het artikel (voorlopig) niet voorradig is, dan wordt dit artikel onder het kopje “nazending” gezet, zie Figuur 72.

NAZENDING 1		TOEVOEGEN
TEMAZEPAM AURO TABLET 10MG 1D1T 26-01-2023 13:12 31 STUK = 74 dagen KH KHO	TEMAZEPAM AURO TABLET 10MG 1D1T 14-12-2022 13-01-2023 30 st = 30 dagen LOKAAL	


Figuur 72 Nazending

Via de “verstrekkingen” kan de lijst ‘nazending’ worden benaderd, zie Figuur 73.

Werklijst Assistent			
Zoeken op achternaam of geboortedatum (ddmmjjjj)	2	Filter	4
CONTROLLEREN			
NAZENDING 1			
			Op Geleverd
	Distributie methode Lokaal	Leverlijn Balie	
	Distributie methode Lokaal	Leverlijn Balie	①
	Distributie methode 2x Lokaal / 1x CF	Leverlijn 3x Balie	
	Distributie methode Lokaal	Leverlijn Balie	
	Distributie methode Lokaal	Leverlijn Balie	①
	Distributie methode Lokaal	Leverlijn Balie	①
	Distributie methode 1x Lokaal / 3x CF	Leverlijn 4x Bezorger	① 3

Figuur 73 Nazending via Werklijst

1. De betreffende nazending van de patiënt kan worden ingezien door op de betreffende regel te klikken. Het patiëntdossier wordt vervolgens weergegeven.
2. Een specifieke client kan in deze werkljst worden gezocht op achternaam of geboortedatum (ddmmjjjj).
3. Achter de patiënt zijn eventuele symbolen aangegeven, zie onderstaande symbolen en hun betekenis (Figuur 74).



Figuur 74 Symbolen

4. De (patiënten)lijst kan worden gefilterd op de bovenbeschreven symbolen.

4.8 Wacht op apotheker

Indien een actie ter controle wordt aangeboden aan de apotheker, door de blauwe knop 'verz. apotheker' te gebruiken (zie voorbeeld Figuur 75), wordt deze op de "verstrekkingen" onder het kopje 'wacht op apotheker' weergegeven (zie rode kader in Figuur 76).

WAARSCHUWING DUBBEL MEDICATIE

METFORMINE HCL MYLAN TABLET 500MG

METFORMINE HCL MYLAN TABLET 500MG + METFORMINE HCL AUROBINDO TABLET 500MG

Volgens de medicatiehistorie heeft de patiënt bij gelijkblijvend gebruik nog voldoende van hetzelfde geneesmiddel op voorraad. Vorige keer is hetzelfde preparaat afgeleverd van een andere fabrikant.

Ga na waarom deze vroege aflevering van het geneesmiddel nodig is.

Ga ook na of preparaatwisseling akkoord is. Denk hierbij aan:

- bekende overgevoeligheid
- bekende wens van patiënt en/of voorschrijver
- handleiding substitutie
- vergoeding

1. HOGERE DOSIS gebruikt dan eerder was voorgeschreven.

Na overleg met patiënt of voorschrijver of de hogere dosering nog steeds de bedoeling is:

- Zo ja: wijzig zo nodig het gebruik en lever af indien preparaatwisseling ook akkoord is (zie hieronder)
- Zo nee:

Opmerkingen

ANNULEREN

VERZ. APOTHEKER

AKKOORD

Figuur 75 Verz. apotheker

Werklijst Assistent

Zoeken op achternaam of geboortedatum (ddmmjjjj)

CONTROLLEREN

UITLEVEREN

NAZENDING

Er zijn geen regels

WACHT OP APOTHEKER

A Appelboom

81 jaar 27-06-1941

1

Figuur 76 "verstrekkingen" - wacht op apotheker

Door op de betreffende patiënt te klikken wordt het patiëntenoverzicht weergegeven, waarbij aan de rechterzijde de controles staan weergegeven. De controle met een symbool met een rood poppetje (zie rode kader in Figuur 77) **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** betreft de controle waarbij actie van de apotheker vereist is (zie ook **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**).

CONTROLES 7

 VERSTREKKINGSVERZOEK CONTROLE
AMOXICILLINE DISPER SANDOZ TABLET 500MG

Controleer de informatie van het verstrekkingverzoek en vul aan w...

 WAARSCHUWING ONVOLLEDIG
AMOXICILLINE DISPER SANDOZ TABLET 500MG


Voer de creatinine waarde van de patiënt in om de juiste waarschu...

Figuur 77 Melding wacht op apotheker

5 Balie


Vanuit het menu , bij Patiënten/ Balie, wordt de afleverinformatie weergegeven. Wanneer de medicatie gereed is, ofwel gecontroleerd en gepickt is, is er bij 'patiënt picken' een opslaglocatie (track & trace locatie) aan de medicatie gekoppeld.

Indien de betreffende patiënt aan de balie staat om zijn medicatie op te halen, kan bij 'balie' de betreffende patiënt worden opgezocht (Figuur 78Figuur 78). Het zoeken kan op geboortedatum of achternaam (of een gedeelte daarvan).



Figuur 78 Balie

Onderstaand scherm wordt weergegeven (**Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**).



Figuur 79 T&T locatie

Door op de betreffende patiënt te klikken wordt het patiëntoverzicht weergegeven. Bij de medicatie (rode kader in Figuur 80) wordt de opslaglocatie (track&trace) weergegeven, in dit voorbeeld U020.




Figuur 80 Opslaglocatie

6 “eindcontroles”

Vanuit het menu , bij Patiënt/ “eindcontroles” wordt de werklĳst voor de apotheker weergegeven (Figuur 81). Deze werklĳst is onderverdeeld in;

- [Wacht op apotheker](#)
- [Controleren](#)
- [Wacht op assistent](#)



Werklijst Apotheker	
WACHT OP APOTHEKER	
Er zijn geen regels	
CONTROLEREN	
Een testter Pimentel	07-11-2023
S. Valerij	09-04-2023
WACHT OP ASSISTENT	
R. Katta	07-11-2023
E. Wiers	07-11-2023
J. Kelder	07-11-2023
W. Hölcker	07-11-2023
M. Crommen	07-11-2023


Figuur 81 “eindcontroles”

6.1 Wacht op apotheker

Op de “eindcontroles” bij ‘wacht op apotheker’ (rode kader Figuur 81) worden patiënten weergegeven waarbij de apotheker een actie dient uit te voeren. In bovenstaande afbeelding zijn geen patiënten weergegeven en staan er geen acties open voor de apotheker.

6.2 Controleren


Op de "eindcontroles" staan bij 'controleren' patiënten weergegeven waarbij de apotheker een controle dient uit te voeren (Figuur 82).



Werklijst Apotheker	
WACHT OP APOTHEKER	
Er zijn geen regels	
CONTROLLEREN	
Een lichte Pijnsticht	31-11-1990
S Valentijn	30-09-1935
WACHT OP ASSISTENT	
R Katta	27-09-1910
E Vries	31-05-1930
J Kelder	22-01-1940
W Hölke	15-03-1950
M Cramm	28-04-1943

Figuur 82 "eindcontroles" - controleren

Door op de betreffende patiënt te klikken (in rode kader weergegeven bij Figuur 83) wordt het patiëntoverzicht weergegeven en kan de apotheker de controle uitvoeren die aan de rechterzijde staat weergegeven in het rode kader in Figuur 83.



TI Frenka	
26-12-1979	
Lichaam cm kg	
Creatinine mg/min	
CONTROLLEREN	
AMOXICILAV ZENTIVA TABLET OMHULD 500/125MG	AMOXICILAV ZENTIVA TABLET OMHULD 500/125MG
20-05-2022 15:24	15:24
OVERIGE	
METFORMINE HCL AUROBINDO TABLET 500MG	
CONTROLES	
HANDMATIG AANGEMAAKT VERSTREKKING	
VERSTREKKINGSGEZONDHEIDSKONTROLE	
WAARSCHUWING ONVOLLEDIG	
LEVERINGSCONTROLES	
EERSTE UITGIFTE GESPREK	

Figuur 83 Patiëntoverzicht - controle uitvoeren

De betreffende controle wordt automatisch naar 'voltooid' verplaatst.
De actie zal hiermee uit de werklĳst 'controleren' van de apotheker verdwijnen.


6.3 Wacht op assistent

Bij 'wacht op assistent' worden de acties voor de assistenten weergegeven. Deze acties verschijnen op de "verstrekkingen", zie *Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..*

Het is mogelijk voor de apotheker om de betreffende acties af te handelen, waardoor deze zullen verdwijnen van de "verstrekkingen".


7 PHM (Herhaalmodule)

Voor het automatisch herhalen van (chronische) medicatie dient bij de betreffende patiënt de functionaliteit voor het proactief herhalen te worden geactiveerd. Dit kan worden gedaan door bij het tabblad “Patiënt” onder het sub-tablad “Diensten en toestemmingen” de toggle ‘Toestemming voor proactief herhalen’ aan te zetten (zie rode kaders in Figuur 84).




Figuur 84 Toggle Proactief herhalen

Vervolgens dient de bij het tabblad “Verstrekingen” de betreffende verstreking(en) te worden geselecteerd, zie rode kaders in Figuur 85 (in onderstaand voorbeeld wordt Simvastatine geselecteerd).



Figuur 85 Selecteer verstreking

Hierdoor wordt onderstaand scherm weergegeven (Figuur 86/Figuur 86).



Figuur 86 Auto plannen


Bij de 'standaardinstellingen' van de verstrekking dienen een aantal punten te worden ingesteld;

1. Zorg dat er een herhaalconditie staat ingevuld (welke conditie maakt niet uit, echter "geen herhaling" is niet mogelijk), zie rode kader in Figuur 86)
2. Zet de toggle "Auto plannen" aan (zie rode kader in Figuur 86)
3. Bepaal de 'volgende verstrekking'; dit is de datum vanaf dat de automatische planner wordt gepland. Vanaf deze datum wordt er continu verder gepland (zie rode kader in Figuur 86). Let op, tot deze datum dient de apotheek eventueel ter overbrugging medicatie te leveren. Deze medicatie dient handmatig te worden toegevoegd, zie hiervoor *Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.*
4. Indien er eventueel nog een verstrekking gekoppeld staat moet deze worden geannuleerd (zie rode kader in Figuur 86).

Let op; bovenstaande stappen dienen per medicijn te worden herhaald (en op dezelfde verstrekingsdatum te worden gezet).

7.1 PHM op “verstrekkingen”

Nadat bij de verstrekkingen het ‘auto plannen’ is ingesteld, berekent het systeem wanneer er nieuwe medicatie geleverd moet worden. 10 dagen voor deze berekende datum (deze datum is per apotheek instelbaar) komt de betreffende patiënt op de “verstrekkingen”, zie rode kader in Figuur 87.



The screenshot shows the 'Werklijst Assistent' (Worklist Assistant) interface. At the top, there is a search bar labeled 'Zoeken op achternaam of geboortedatum (ddmmjjjj)' and a 'Filter' dropdown. Below the search bar, there are date pickers for 'Start dd-mm-jjjj' and 'Einde dd-mm-jjjj'. The main area is titled 'CONTROLEREN' and contains a table with the following columns: 'Distributie methode' (Distribution method), 'Leverlijn' (Delivery line), and 'Op Geleverd' (Delivered). The table lists several medication deliveries. One row is highlighted in blue and marked with a blue circular icon, indicating a PHM patient. This row is circled in red in the original image.

Figuur 87 PHM op “verstrekkingen”


De PHM-patiënt wordt op de “verstrekkingen” gekenmerkt door een blauwe kleur en een herhaal-symbool (zie Figuur 87). De verstrekking(en) kunnen via de “verstrekkingen” verder afgehandeld worden (controleren, (CF)inkopen/ picken en klaarzetten voor aflevering).

8 Papieren receptverwerking

Indien een recept niet digitaal wordt aangeleverd, maar bijvoorbeeld doordat de patiënt aan de balie een papieren recept aanbiedt, dan wordt er niet via de werklíst gewerkt. De volgende stappen dienen doorlopen te worden;

De patiënt kan worden opgezocht (zie *Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.*).

Vervolgens worden de patiëntgegevens weergegeven, klik op het tabblad 'verstrekkingen' zoals in onderstaand in Figuur 88. Klik vervolgens op 'toevoegen' om het verstrekkingverzoek toe te voegen.



Figuur 88 Patiënt overzicht


Volg vervolgens de stappen zoals beschreven in **hoofdstuk 4.1 Verstrekkingverzoek toevoegen**.

9 Overige functionaliteiten

In dit hoofdstuk worden overige functionaliteiten in FarmaSys 6 toegelicht.


9.1 Patiënt Memo

Er kan een patiënt memo worden toegevoegd door op de blauwe balk van de patiëntgegevens te klikken zoals in het rode kader in Figuur 89.



Figuur 89 Patiënt Memo


Door op de blauwe plus te klikken (zie Figuur 90) kan een memo worden toegevoegd, onderstaand scherm wordt weergegeven.



Figuur 90 Memo toevoegen


De memo kan in het witte venster worden getypt. Bij 'soort' kan er een keuze worden gemaakt uit 'opmerking, urgente vraag/ waarschuwing of financieel'. Kies vervolgens de blauwe knop opslaan.

De memo wordt opgeslagen in de betreffende kleur en er wordt tevens een 'ballonnetje' (zie rode kader in Figuur 91) achter de patiëntnaam weergegeven zodat de assistente op de memo wordt geattendeerd.



Figuur 91 Diverse memo's


Door op de betreffende memo te klikken kan deze eventueel gewijzigd of verwijderd worden (Figuur 92).



Figuur 92 Memo wijzigen of verwijderen

9.2 Printen toedieningsplan

Het printen van een toedieningsplan kan worden gedaan door de betreffende patiënt op te zoeken (*Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.*) en te klikken op het tabblad 'verstrekkingen' (rode kader in Figuur 93). De medicatie van de betreffende patiënt wordt weergegeven. Klik op de blauwe knop 'print' en kies voor "Toedieningsplan".



Figuur 93 Printen toedieningsplan

Onderstaand scherm wordt geopend (Figuur 94) waar de (start- en stop)datum van het toedieningsplan kan worden ingevoerd. Hier kan ook de kalender voor worden gebruikt. Klik vervolgens op de groene knop 'toestemming'.

Selecteer Interval

Startdatum

28-10-2021

Stopdatum

28-04-2022


TOESTEMMING

Figuur 94 Toedieningsplan interval

Het toedieningsplan wordt vervolgens weergegeven, zie onderstaand voorbeeld (Figuur 95).

9.3 Printen AMO

Het printen van een actueel medicatie overzicht (AMO) kan worden gedaan door de betreffende patiënt op te zoeken (*Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.*) en te klikken op het tabblad 'verstrekkingen' (rode kader Figuur 96). De medicatie van de betreffende patiënt wordt weergegeven. Klik op de blauwe knop 'print' en kies voor "Medicatieoverzicht".



Figuur 96 AMO

Onderstaand scherm wordt geopend (Figuur 97) waar de (start- en stop)datum van de AMO kan worden ingevoerd. Hier kan ook de kalender voor worden gebruikt. Klik vervolgens op de groene knop 'toestemming'.

Selecteer Interval

Startdatum

28-10-2021

Stopdatum

28-04-2022

TOESTEMMING

Figuur 97 AMO interval


De AMO wordt vervolgens weergegeven, zie onderstaand voorbeeld (Figuur 988).

Medicatieoverzicht: 31-Jan-2023						
Patient	Dhr. H. Test	BSN		Gecontroleerd door zorgverlener	Ja/Nee	Algegeven door: Apotheek
Adres	Teststraat 54 B	Geb. datum	08-04-1977	Geverifieerd door patient	Ja/Nee	
Postcode & Plaats	1234 AB Teststad	Geslacht	Man	Patient heeft innameschema	Ja/Nee	
Telefoonnummer	0612345678	Lengte	79 cm	Datum Lengte	31-01-2023	Tel: +31
		Gewicht	185 kg	Datum gewicht	31-01-2023	
Intoleranties, Contra-indicaties, Allergieën (ICA)						
Omschrijving	Datum	Inddatum	Soort	Opmerking	Melder	
PENICILLINES			Allergie			
Medicatie (Voorschriften/ Afleveringen)						
Geneesmiddel (op ATC code)	Datum	Inddatum	Gelev. tot	Dosering	Toelichting	TW
METFORMINE TABLET 500MG	18-08-2022			1d1t		ORAAL CTAM Janssen
METFORMINE HCL AUROBINDO TABLET 500MG	16:21					
IBUPROFEN TABLET 600MG	31-01-2023			2d1t		ORAAL MEH DECKERS
IBUPROFEN TEVA TABLET OMHULD 600MG	13:45					
Recent gestopte medicatie (gedurende ziekenhuisopname/ afgelopen 90 dagen)						
Geneesmiddel (op ATC code)	Datum	Inddatum	Gelev. tot	Dosering	Toelichting	TW
SIMVASTATINE MYLAN TABLET	30-08-2022	01-09-2022		2D1T		ORAAL MEH DECKERS
FILMOMHULD 40MG	12:43	12:43				
Aanvullende labwaarden op aanvraag.						
Lab	Datum	Uitslag	Methode/referentiewaarde			
Creatinine	31-01-2023	116 µl/min				

Figuur 98 voorbeeld AMO

9.4 Printen bezorgetiket

Het printen van een (extra) bezorgetiket kan worden gedaan door de betreffende patiënt op te zoeken (**3.1 Patiënt opzoeken**) en te klikken op het tabblad 'verstrekkingen' (rode kader in Figuur 99). De medicatie van de betreffende patiënt wordt weergegeven. Klik op de blauwe knop 'print' en kies voor "Bezorgetiket".



Figuur 99 Bezorgetiket


Het (extra) bezorgetiket wordt geprint (zie voorbeeld Figuur 100).

Dhr. T. Test
Teststraat 94
1234 AB Teststad NL

Figuur 100 Voorbeeld bezorgetiket

9.5 Printen extra (recept)etiket

Het printen van een (extra) receptetiket kan worden gedaan door de betreffende patiënt op te zoeken (**3.1 Patiënt opzoeken**) en te klikken op het tabblad 'verstrekkingen' (rode kader in Figuur 101). De medicatie van de betreffende patiënt wordt weergegeven. Klik op de blauwe knop 'print' en kies voor "Receptetiket".



Figuur 101 Extra etiket


Het (extra) receptetiket wordt geprint (zie voorbeeld Figuur 102).



Figuur 102 extra receptetiket


9.6 Bezorgen

Indien de medicatie van de patiënt (altijd) bezorgd dient te worden, kan de patiënt als 'bezorger' worden gemarkeerd. 'Door de betreffende patiënt op te zoeken, kan bij 'Patiënt' tabblad 'diensten en toestemmingen' voor de leveringsmethode 'Bezorger' worden gekozen (zie rode kader in Figuur 103). Klik vervolgens op de groene knop 'opslaan'.



Figuur 103 Bezorger

Nadat de leveringsmethode 'bezorger' is opgeslagen wordt er een bezorg-symbool weergegeven in het patiëntoverzicht (zie rode kader in Figuur 104).



Figuur 104 Bezorgsymbool

Daarnaast kan er per verstrekking een keuze worden gemaakt of deze bezorgd dient te worden. Door op de betreffende verstrekking te klikken kan de leverlijn worden aangegeven of gewijzigd worden.

9.7 Servicepunt

Indien de medicatie van de patiënt (altijd) bij het servicepunt geleverd dient te worden, kan bij de betreffende patiënt, bij 'Patiënt' tabblad 'diensten en toestemmingen', de leveringsmethode 'Servicepunt' worden gekozen (zie rode kader Figuur 105). Klik vervolgens op de groene knop 'opslaan'.



Figuur 105 Servicepunt

Nadat de leveringsmethode 'servicepunt' is opgeslagen wordt er een servicepunt-symbool weergegeven in het patiëntoverzicht (zie rode kader in Figuur 106).



Figuur 106 Symbool Servicepunt

Daarnaast kan er per verstrekking een keuze worden gemaakt of deze via het servicepunt geleverd dient te worden. Door op de betreffende verstrekking te klikken kan de leverlijn worden aangegeven of gewijzigd worden.

9.8 Medicijnkluis/ locker

Indien de medicatie van de patiënt (altijd) via de medicijnkluis/locker geleverd dient te worden, kan bij de betreffende patiënt, bij 'Patiënt' tabblad 'diensten en toestemmingen', de leveringsmethode 'Kluisje' worden gekozen (zie rode kader Figuur 107). Klik vervolgens op de groene knop 'opslaan'.



Figuur 107 Kluisje

Nadat de leveringsmethode 'Kluisje' is opgeslagen wordt er een kluis-symbool weergegeven in het patiëntoverzicht (zie rode kader in Figuur 108).




Figuur 108 Symbool kluisje

Daarnaast kan er per verstrekking een keuze worden gemaakt of deze via de medicijnkluis/locker geleverd dient te worden. Door op de betreffende verstrekking te klikken kan de leverlijn worden aangegeven of gewijzigd worden.


9.9 IMM

Indien de medicatie van de patiënt (altijd) bij de voorschrijver (IMM) geleverd dient te worden, kan bij de betreffende patiënt, bij 'Patiënt' tabblad 'diensten en toestemmingen', de leveringsmethode 'IMM' worden gekozen (zie rode kader in Figuur 109). Klik vervolgens op de groene knop 'opslaan'.




Figuur 109 IMM

Daarnaast kan er per verstrekking een keuze worden gemaakt of deze via "IMM (afgeven bij de huisarts)" geleverd dient te worden. Door op de betreffende verstrekking te klikken kan de leverlijn worden aangegeven of gewijzigd worden. Onderstaand scherm wordt weergegeven (Figuur 110) waarbij de leverlijn (rode kader) op 'IMM' kan worden gezet.



Figuur 110 Leverlijn in verstrekking

Bij de betreffende verstrekking(en) wordt tevens 'IMM' weergegeven (zie Figuur 111)



Figuur 111 IMM in verstrekking weergegeven

Naast 'IMM' is tevens een 'locatie-symbool' weergegeven (zie rode kader in Figuur 111). Bij het printen van de etiketten wordt tevens een bezorg-etiket van de betreffende voorschrijver geprint.